



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
04.10.2018 № 1810  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/7319/01/01

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

## **ХОМВІО®-НЕРВІН** **(HOMVIO®-NERVIN)**

### **Склад:**

*діючі речовини:*

1 таблетка містить:

Sepia D<sub>4</sub> (сепія D<sub>4</sub>)..... 64 мг,

Ambra D<sub>2</sub> (амбра D<sub>2</sub>)..... 64 мг,

Hyoscyamus D<sub>3</sub> (гіосціамус D<sub>3</sub>).....32 мг,

Ignatia D<sub>3</sub> (ігнація D<sub>3</sub>)..... 32 мг;

*допоміжні речовини:* лактоза моногідрат, магнію стеарат, крохмаль кукурудзяний.

**Лікарська форма.** Таблетки.

**Основні фізико-хімічні властивості:** біла, з дрібними, поодинокими вкрапленнями коричневого або темного кольору двоопукла таблетка, солодкувата на смак.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

### **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Лікарській засіб для лікування функціональних нервових і психічних розладів. Біологічно активні речовини препарату діють як транквілізатор та антидепресант, впливають на центральну і периферичну нервову систему.

**Фармакокінетика.** Не вивчалась.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

- Неврози, нервове збудження: тремтіння у тілі, страх, запаморочення;
- безсоння через розумове та фізичне перевантаження;
- депресивні стани легкого ступеня тяжкості;
- психосоматичні розлади;
- нейроциркуляторна дистонія, мігрень;
- старечий тремор, невпевнена хода, забудькуватість, паркінсонізм;
- невротичні, психотичні та вегетативні розлади при вікових змінах гормонального фону (клімакс у жінок та чоловіків, період статевого дозрівання у підлітків);
- свербіж шкіри та статевих органів;
- артеріальна гіпертензія, хронічна ішемічна хвороба серця (у складі комбінованої терапії).

**Противпоказання.** Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до будь-якого з його компонентів. Діти віком до 12 років

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами невідомі. Куріння, вживання алкоголю і тонізуючих напоїв (чай, кава) можуть послаблювати дію гомеопатичних засобів. При одночасному застосуванні інших лікарських засобів необхідно повідомити про це лікаря.

### **Особливості застосування.**

Після прийому першої дози лікарського засобу можливе короточасне посилення основних симптомів (гомеопатичний ефект першої дози). У такому випадку необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря. Перші ознаки поліпшення стану з'являються через 1 тиждень від початку лікування. Препарат містить лактозу. Не застосовувати пацієнтам зі спадковою непереносимістю галактози, при дефіциті лактази Лаппа або порушенні мальабсорбції глюкози-галактози.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності або годування груддю застосовувати після консультації лікаря у випадку, якщо користь від застосування препарату переважає потенційний ризик для плода/дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

У рекомендованих дозах не впливає на швидкість психомоторних реакцій при керуванні автотранспортом або роботі з механізмами.

**Спосіб застосування та дози.**

При хронічному перебігу хвороби початкова доза для дорослих та дітей віком від 12 років становить 1 таблетку 1-3 рази на добу. Тривалість терапії визначається індивідуально лікарем, але повинна бути не менше 4-6 тижнів. У гострих випадках приймати по 1 таблетці щопівгодини або щогодини, але не більше 12 разів на добу. Можливість застосування лікарського засобу більше одного тижня визначається після консультації лікаря. При послабленні проявів хвороби дозу зменшити до 1 таблетки 3 рази на добу та приймати протягом 2-3 місяців.

Далі переходити на підтримуючу дозу – 1-2 таблетки 1 раз на день або через день протягом тривалого часу. Таблетки тримати у роті до повного розчинення за 30 хв до або через 30 хв після їди.

Якщо симптоми зберігаються під час застосування лікарського засобу, зверніться за консультацією до лікаря.

*Діти.*

Застосовують дітям віком від 12 років.

**Передозування.**

При застосуванні великої кількості препарату (більше 12 таблеток на добу) можливі біль у животі, блювання, діарея.

**Побічні реакції.**

Можливі реакції підвищеної чутливості до будь-якого з компонентів препарату.

**Термін придатності.** 5 років.

**Умови зберігання.** Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

**Упаковка.** По 25 таблеток у блістері; 2 блістери в картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** Маурманн – Арцнайміттель КГ, Німеччина (Mauermann – Arzneimittel KG, Germany).

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Хенріх-Кнотте-Штрассе 2, 82343 Пьокінг, Німеччина (Heinrich-Knote-Strasse 2, 82343 Pocking, Germany).

**Заявник.**

Хомвіора Арцнайміттель Др. Хагедорн ГмБХ і Ко. КГ, Німеччина (Homviora Arzneimittel Dr. Hagedorn GmbH & Co. KG, Germany).

**Місцезнаходження заявника.**

Арабеллаштрассе, 5, Д-81925, Мюнхен, Німеччина (Arabellastrasse 5, D-81925, Munchen, Germany).

**Дата останнього перегляду.** Наказ МОЗ України від 27 грудня 2019 р № 2691.

